

TIPS:

- Raadpleeg altijd een dierenarts of een Animal Health Assistant voor advies over het gebruik van medicatie.
- Zorg voor een goede hygiëne: Zorg ervoor dat het hok schoon en droog is en dat de kippen voldoende ruimte hebben. Verwijder regelmatig de mest en zorg voor schoon drinkwater.
- Pluimvee moet altijd voldoende, schoon en koel drinkwater hebben. Hygiëne van drink – en voederbakken is belangrijk voor de gezondheid van de kippen en om ziekten te voorkomen
- Houdt de kweekomgeving schoon, droog, goed geventileerd en vrij van onkruid, ongedierte en ander gevogelte (goede hygiëne).
- Geef de kippen een uitgebalanceerd dieet: Een gezond dieet versterkt de weerstand van de kippen tegen ziekten, waaronder coccidiose. Geef indien en waar mogelijk voer met coccidiostatica
- Voorkom stress: Stress kan de weerstand van de kippen verlagen en ze vatbaar maken voor coccidiose. Zorg voor een rustige omgeving en voorkom overbezetting.
- Laat geen mensen (personeel) van andere bedrijven toe op uw bedrijf, mits hun laarzen zijn ontsmet en zij schone kleding aan hebben.
- Kippen en ander gevogelte van buiten de kweeklocatie gehaald kunnen coccidiose meebrengen en verspreiden. Houdt ze in eerste instantie apart. Observeer ze goed op tekenen van ziekte alvorens toe te voegen bij de rest van kweek.

Ga **ALTIJD** na welk coccidiostaticum in het voer is verwerkt en met welke geneesmiddelen dit **NIET** gelijktijdig mag worden toegediend!

MORE THAN 75 YEARS OF FEED EXCELLENCE

De onmisbare schakel in de Surinaamse veeteelt sector

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting.

HET GEBRUIK VAN COCCIDIOSTATICUM TER BESTRIJDING VAN COCCIDIOSE



Vitalo

Superfeed since 1950

Surinaams Veevoerbedrijf Vitalo N.V.
FABRIKANT VAN VITALO SUPERFEED

J.A.Pengelstraat 220
Paramaribo- Suriname

E-Mail: info@vitalosuperfeed.com

HET GEBRUIK VAN COCCIDIOSTATICUM TER BESTRIJDING VAN COCCIDIOSE

VITALO N.V.

Het Surinaams Veevoerbedrijf VITALO bestaat sinds 23 juni 1950. Dit bedrijf is Feed Chain Alliance (FCA) gecertificeerd. Vitalo produceert kwalitatief hoogwaardige veevoer soorten voor de veeteeltsector volgens de EU normen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de klant. Vitalo slaagt erin om de FCA OVOCOM standaard met de meest stringente voorwaarden te implementeren.

Wat is coccidiose?

Coccidiose is een veelvoorkomende darmparasiet bij kippen die ernstige problemen kan veroorzaken, zoals bloederige diarree, gewichtsverlies en zelfs sterfte. Voor de kweker kan financiële schade (door minder goede groei/ hogere voederconversie) opleveren en is het daarom belangrijk om coccidiose effectief te bestrijden.

Hoe verspreidt de ziekte zich/ hoe te voorkomen?

Op vochtige bodems groeien en vermeerderen de parasieten zich snel. Preventie is altijd beter dan genezen. Een goede hygiëne is essentieel om coccidiose te voorkomen en te bestrijden. Maak de voeder- en drinkbakken elke dag schoon. Laat geen mensen (personeel) van andere bedrijven toe op uw bedrijf, mits hun laarzen zijn ontsmet en zij schone kleding aan hebben.

Zorg ervoor dat het hok schoon en droog is, en dat de kippen voldoende ruimte hebben. Verwijder regelmatig de mest en zorg voor schoon drinkwater. Houdt de omgeving schoon (hygiënisch) en vrij van andere gevogelte en dieren, die ziektedragers kunnen zijn.

Bestrijding/behandeling van coccidiose

Er zijn verschillende manieren om coccidiose te bestrijden:

- Medicatie: Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar die coccidiose kunnen bestrijden, zoals antibiotica en coccidiostatica. Het is belangrijk om de juiste medicatie te gebruiken en de dosering nauwkeurig te volgen.
- Natuurlijke middelen: Er zijn ook natuurlijke middelen die kunnen helpen bij de bestrijding van coccidiose, zoals probiotica. Deze middelen kunnen de darmflora van de kippen versterken en zo de weerstand tegen coccidiose verhogen.

Het gebruik van coccidiostatica

Tot nu toe is het gebruik van coccidiostatica de manier bij uitstek om coccidiose in de pluimveesector te beheersen. Voer met coccidiostatica wordt aan kippen gevoerd om te voorkomen dat de parasiet zich gaat ontwikkelen. Bij het gebruik van voer met coccidiostaticum moet er rekening worden gehouden met de volgende punten:

1. Voor welke dieren is het bestemd. Het mag niet worden gevoerd aan paarden en paardsoorten.
2. Wat is de wachttijd.
3. Bij gelijktijdige toediening met bepaalde antibiotica kan een negatief resultaat optreden, omdat de middelen elkaar tegenwerken. De gevolgen hiervan zijn een groeiachterstand en hoge sterfte.

Ter voorkoming van de residuproblematiek in eieren en vlees wordt aanbevolen om volgens voorschrift over te schakelen naar voer zonder coccidiostaticum, of voer met coccidiostatica die geen wachttijd heeft. Lees vóór gebruik de etiketten altijd nauwkeurig!

Coccidiostaticum via het drinkwater toedienen, wanneer de kippen al ziek zijn.

Amprolium is een thiamine antagonist dit wil zeggen dat het tegen thiamine werkt. Thiamine is vitamine B1. Amprolium is geen antibioticum, maar het belemmert de benutting van vitamine B1 door de parasiet. Lees het voorschrift nauwkeurig voor de dosering en toedieningsperiode.

Let op: GEEN Amprolium via het drinkwater toedienen bij het gebruik van voer met coccidiostaticum!

VITALO...Veevoer vrij van antibiotica en diermeel...
SUPER GEZOND!