

TIPS:

- Lees vóór gebruik het etiket altijd nauwkeurig.
- Het voer moet DROOG en KOEL worden opgeslagen en wel buiten invloed van direct zonlicht en schadelijke stoffen.
- Houdt uw voeropslag- en transportruimte schoon en vrij van gevaarlijke stoffen en ongedierten z.a.: ratten, insecten etc.
- Houd zoveel mogelijk een voer- en groeiadministratie op na. Vraag naar het ras en de kweek- en management richtlijnen die van toepassing zijn bij de kippen.
- Volg het vaccinatieschema dat afkomstig is van uw broederij en/of dierenarts.
- Voer bij voorkeur 2x daags. De eerste helft smorgens vroeg en de rest (andere helft) smiddags laat.
- Zorg ervoor dat het voer in de voerbakken goed afzakt. Let hierbij op de afstelling van de bakken en evt. regelmatig doorsteken of schudden van de bakken.
- Plaats voer- en drinkbakken op rughoogte van de kippen.
- Voer bij voorkeur niet tijdens de warme uren van de dag. De onrust tijdens het voeren verhoogt de warmteproductie van de kippen en een volle krop kan leiden tot verstikking.
- Verstikking kan worden voorkomen door ze te stimuleren om tijdens de koele uren van de dag extra te eten en tijdens de hete uren van de dag geen voer te geven.
- Zorg voor rust rondom de hokken.
- Hygiëne van drink – en voederbakken is belangrijk voor de gezondheid van de kippen en om Salmonella te voorkomen.
- Pluimvee moet altijd voldoende, schoon en koel drinkwater hebben.
- Optimale leg productie wordt gehaald als de daglengte wordt verlengd tot 16 uren licht per dag m.b.v.TL buizen.

- Bezettingsdichtheid. Legkippen: 5- 8 dieren per m2.
- Het liefst de legnesten gelijk met het inzetten van een nieuwe flock in de hokken plaatsen waardoor ze er aan gewend raken. Plaats deze bij voorkeur op de rustige en donkere plekken van het hok. Eenmaal geplaatst moeten de legnesten regelmatig van nieuw strooisel worden voorzien.
- Het beste is om meerdere keren per dag eieren te rapen. Zo worden ze minder bevuild en de kans op ei breuk is kleiner. Ter voorkoming van het aanleren van verkeerde gewoonte moeten grondeieren zo snel mogelijk worden geraapt.
- Ongewassen eieren blijven langer goed dan gewassen eieren. Het gedroogde smeersel van de eileider voorkomt het binnendringen van lucht door de poriën van de schaal. Anderzijds kunnen aan de schaal wel schadelijke bacteriën (Salmonella) kleven.
- Eieren worden best bewaard in een luchtgekoelde (airco) ruimte met de stompe kant naar boven, de luchtbel zit dan boven (temp. 22-24 °C).
- Bij het constateren van ziektesymptomen moet u spoedig in contact treden met de dierenarts/animal health assistant om zodoende een duidelijke diagnose vast te stellen en onnodige verliezen te voorkomen.
- Op de afdeling Voorlichting kunt u vragen naar informatie over de voeropname, het gewichtsverloop en het lichtprogramma voor legkippen.

DE KWEEK VAN LEGKIPPEN



Vitalo

Superfeed since 1950

MORE THAN 75 YEARS OF FEED EXCELLENCE

De onmisbare schakel in de Surinaamse veeteelt sector

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting.

Surinaams Veevoerb企业 Vitalo N.V.
FABRIKANT VAN VITALO SUPERFEED

J.A.Pengelstraat 220
Paramaribo- Suriname
E-Mail: info@vitalosuperfeed.com

DE KWEEK VAN LEGKIPPEN

VITALO N.V.

Het Surinaams Veevoerbedrijf VITALO bestaat sinds 23 juni 1950. Dit bedrijf is Feed Chain Alliance (FCA) gecertificeerd. Vitalo produceert kwalitatief hoogwaardige veevoer soorten voor de veeteeltsector volgens de EU normen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de klant. Vitalo slaagt erin om de FCA OVOCOM standaard met de meest stringente voorwaarden te implementeren.

Deze sector is de belangrijkste eiwitvoorzienaar als het gaat om de productie en het aanbod van vlees en eieren.

Legkuikens groeien in 16 weken op tot jonge hennen. Als ze 16- 20 weken oud zijn, beginnen ze met leggen. Vanaf dat moment leggen ze ongeveer 5 eieren/week en wel 18 maanden lang.

Een Haan nodig? Het antwoord is nee. Een kip legt even goed eieren met of zonder een haan. De hanen zorgen vaak voor onrust in de hokken. Voor consumptie door de mens worden onbevuchte eieren geprefereerd.

Voeding van legkippen

De basis voor een topproductie wordt al in de opfokperiode van de hen gelegd, hierbij is de voeding cruciaal (zie Folder 4).

Huisvesting van legkippen

Eendagskuikens moeten in aangepaste hokken met een aangepaste temperatuur worden opgevangen. Zo een hok (ring) moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie Folder 1). De kuikens worden opgefokt tot legrijpe leeftijd (16 weken).

Eindfase van de opfok (16-20 weken)

• Snavelbranden

Op een leeftijd van 2 weken worden de snavels gebrand. Indien nodig wordt herhaald het liefst voor de legperiode. Snavelbranden tijdens de leg moet worden voorkomen, want dit brengt een sterke daling van de productie met zich mee (stress). Tip: het toedienen van anti-stressmiddelen voor en na het snavelbranden (Oligovit).

• Selectie

Bij selectie worden dieren uit de groep gehaald op grond van uiterlijk waarneembare verschijnselen (bijvoorbeeld: achterblijvers/ zieke dieren) en de mate van lage productiviteit(eiproductie).

• Verhuizing

Indien de kippen niet in de leghokken zijn gekweekt moeten de kippen worden verhuisd hiernaartoe. Het is aan te raden dit op de koelere en donkere momenten van de dag te doen. Het vangen moet zorgvuldig gebeuren ter voorkoming van onnodige stress. Met behulp van een vanghek moeten de kippen in een hoek worden afgezonderd, bij de poten worden gepakt en in kratten gedaan.

• Legnesten

Hennen leggen hun eieren in legnesten. Deze kunnen het best een maand voor de leg in de hokken worden geplaatst om de kippen te laten wennen. Afmeting:

- Individueel: 40 x 30 x 35 cm (h x b x d)
- Gemeenschappelijk: 60 x 180 x 40 cm

Voor de legnesten geldt een 15 cm hoge voorrand en een 10 cm dikke strooisellaag.

Bezetting: 17 kippen per legbox (traditionele legbox)

Licht

De verlichtingsduur voor een optimale leg is 16 uren. In perioden wanneer de dagen korter zijn, kan met behulp van kunstmatige verlichting de productie worden opgevoerd. De kweker moet er evenwel voor zorgen dat de kippen minstens 8 uren aan een stuk, dus ononderbroken, nachtrust hebben. Een leghen heeft ook haar rustperiode nodig.

Het rapen van de eieren

De eerste eieren zijn vaak heel klein (± 35 gram). Al vlug worden de eieren groter (≥ 60 gram) en het gewicht blijft hierna min of meer constant. Er zijn rassen met kleine eieren en andere die grote eieren leggen. Het is het best de eieren meerdere keren per dag te rapen. Zo worden ze minder bevuild. Wanneer er (te) veel eieren in het nest liggen is de kans op breuk groter.

Doorgaans leggen hennen het eerste 1,5 jaar goed en wordt het daarna minder. In zeer hete perioden leggen de kippen minder eieren (hitte stress).

Door regelmatig een vitaminekuur (vooral Oligovit/ Redustress en vitamine C) via het drinkwater te geven kunnen de gevolgen van (hitte) stress worden geminimaliseerd.

Administratie

Het is belangrijk om de administratie bij te houden, hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de opfok- en productie-periode. Tijdens de opfok worden de volgende gegevens wekelijks bijgehouden nl.: voerverbruik, sterfte, gewicht, medicaties en vaccinaties. Dagelijks wordt in de productieperiode het volgende bijgehouden: aantal eieren, sterfte en het voerverbruik. Aan de hand van deze gegevens wordt berekend: de voederconversie, het legpercentage, het gemiddelde voerverbruik en uitvalspercentage (sterfte).

VITALO...Veevoer vrij van antibiotica en diermeel...
SUPER GEZOND!