

Opvang van de kuikens

- Kuikens gelijk na aankomst water met electrolyten te drinken geven (zie Folder 1).
- De voederplaten worden pas gevuld als de kuikens tot rust zijn gekomen (2 uren na aankomst).

Maatregelen om een kip goed te laten groeien:

- Voer van goede kwaliteit dus VITALO SUPERFEED van VITALO verstrekken.
- De kippen ad libitum voeren (er moet altijd voer in de bakken zijn).
- Voldoende schone drink- (1 drinker per 100 kippen) en voerbakken (1 bak per 40-50 kippen) in de hokken plaatsen.
- 1x 24 uur verlichting (kip gaat daardoor dag en nacht eten).
- Geen te dichte hokbezetting (8- 10 kippen per m2).
- Goed geventileerde of gekoelde hokken die tevens afgeschermd zijn tegen direct zonlicht.
- Goede ziektepreventie en op tijd behandelen van ziekten.

Maatregelen om de kans op ziekten te minimaliseren:

- Pas het all- in all- out systeem toe bij de kweek.
- Na elke partij in deze volgorde:
 - 1) het hok schoonmaken (strooisel en mest verwijderen),
 - 2) het hok wassen met zeep,
 - 3) behandelen tegen ongedierte/insecten en
 - 4) ontsmetten.
- Het hok en de kweekinventaris moet 2 weken voor de volgende inzet al ontsmet en gereinigd zijn.
- De drink- en voerbakken ook ontsmetten met ontsmettingsmiddel dat te verkrijgen is bij Vitalo (HI-7 Desinfectant).
- Watertank en -leidingen voor de inzet ontsmetten en goed doorspoelen. Vers water van goede kwaliteit verstrekken.
- Geen oud of beschimmeld voer verstrekken. Toepassen van preventieve hygiëne maatregelen (het plaatsen van ontsmettingsbakken bij de in- en uitgangen)
- Opvolgen van een vaccinatieschema van de broederij.

- De kuikens warm, droog en uit de wind houden (het hok afschermen, kuikenring en lamp plaatsen)
- Zwakke of zieke dieren verwijderen uit de hokken en afzonderen.
- Dode kippen verbranden of diep begraven.

Het vangen en transporteren van slachtkippen

De mensen die belast zijn met het vangen van de kippen moeten ervaren zijn en het is zeer belangrijk dat de kweker erbij is om ervoor te zorgen dat de juiste procedure wordt gevolgd.

- De kippen moeten in de vroege ochtend of late middag worden gevangen en geladen, want ze zijn dan minder actief en de omgeving is koeler.
- De kippen moeten 8 uren vóór het vangen, worden onthouden van voer door de voerbakken te verwijderen of ze hoog te plaatsen.
- De automatische drinkers moeten vóór het vangen van de kippen worden verwijderd of hoog geplaatst worden.
- Ga rustig te werk bij het vangen van de kippen en werk vanuit een vooraf geïsoleerd groep.
- Met een draagbare draadafschutting/hardboard platen kan het hok in kleine vakjes worden verdeeld.
- Breng steeds een kleine hoeveelheid van de kippen in een vakje bijeen om dooddrukken en verwondingen te voorkomen. De kippen mogen niet geschopt en gegoid worden.
- De kippen moeten aan de poten gehouden worden (max 4-5 kippen per hand) tijdens het vangen en voorzichtig in de transportkrat (max. 10 per krat) gezet worden. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de gevulde kratten.
- De transport ruimte moet schoon, goed geventileerd en koel zijn.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting.

DE KWEK VAN SLACHTKIPPEN



Vitalo

Superfeed since 1950

MORE THAN 75 YEARS OF FEED EXCELLENCE

De onmisbare schakel in de Surinaamse veeteelt sector

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting.

Surinaams Veevoerb企业 Vitalo N.V.
FABRIKANT VAN VITALO SUPERFEED

J.A.Pengelstraat 220
Paramaribo- Suriname
E-Mail: info@vitalosuperfeed.com

DE KWEEK VAN SLACHTKIPPEN

VITALO N.V.

Het Surinaams Veevoerbedrijf VITALO bestaat sinds 23 juni 1950. Dit bedrijf is Feed Chain Alliance (FCA) gecertificeerd. Vitalo produceert kwalitatief hoogwaardige veevoersoorten voor de veeteelt-sector volgens de EU normen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de klant. Vitalo slaagt erin om de FCA OVOCOM standaard met de meest stringente voorwaarden te implementeren.

Pluimvee

De pluimveesector is de belangrijkste eiwit voorziener als het gaat om de productie en het aanbod van vlees, vleesproducten en eieren.

Het vetmesten van eendagskuikens tot slachtrijpe kippen (≥ 2 kg) duurt, afhankelijk van het gebruikte ras, minstens 5-6 weken.

Bij de kweek dient rekening gehouden te worden met de volgende factoren:

de omgevingscondities (hygiëne, temperatuur, ligging van het hok en de luchtvochtigheid in het hok)
het dier (ras, gewicht, leeftijd, opnamecapaciteit, lichaamsconditie en productiestadium van het dier)
de voeding (vorm, structuur, smakelijkheid, energieniveau en de nutritionele samenstelling)
preventieve gezondheidszorg en vaccinaties.

De groei bij kippen wordt voornamelijk bepaald door het opnemen van voer dat voldoet aan de nutritionele behoefte van de kip.

De voeding van slachtkippen

De voeding van slachtkippen dient voor het in stand houden van het lichaam en voor de productie van vlees.
(zie FOLDER 3)

In de tabel hieronder wordt het gemiddelde voerverbruik per kip per week weergegeven.

Vergelijk voerverbruik per kip/week (gram)	
Leeftijd (dgn)	Gemidd. vitalo proeven en literatuur waarde Cobb 500
7	141
14	324
21	617
28	888
35	1191
42	1373
Totaal	4534

bron: *Vleeskuiken Resultaten & Voedings Supplementen voor Cobb 500 en Resultaten van uitgevoerde proeven door Vitalo.*

Huisvesting van slachtkippen

Eendagskuikens moeten in aangepaste hokken met een aangepaste temperatuur worden opgevangen. Zo een hok moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie Folder 1).

All- in/ all- out systeem

Het all- in/ all- out systeem ligt aan de basis van een goede bedrijfs- en hokhygiëne wat betekent dat alle dieren tegelijk worden aan- en afgevoerd.

Microklimaatcontrole

Aan het gedrag van de kuikens kan men zien of de temperatuur in het hok optimaal is. Een kip probeert zoveel mogelijk de in het lichaam geproduceerde warmte kwijt te raken.

Bij een te lage temperatuur zitten de kuikens bij elkaar onder de lampen en bij een te hoge zitten ze verspreid en verwijderd/ver van de lampen.

Als het warm is bewegen ze minder en zoeken een koele plek in het hok. Ook houden ze hun vleugels meestal van het lichaam af en de bek open (hijgen).

Kippen kunnen niet zweten, maar ze beschikken wel over andere mechanismen om lichaamswarmte kwijt te raken. Eén hiervan is hijgen. Een kip zal gaan hijgen als de temperatuur in haar omgeving 30°C of hoger is.

Hoge omgevingstemperaturen gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid zijn vaak fataal voor kippen, omdat ze geen warmte kwijt kunnen door verdamping. Door deze hoge omgevingstemperatuur komen de kippen onder stress te staan. Dit verschijnsel wordt hittestress genoemd.

Hittestress kan ook voorkomen worden door hitte folie te plaatsen onder het dak/de zinkplaat.

Plaats waar nodig ventilatoren voor de aanvoer van frisse lucht en de afvoer van ammoniakdamp.

Administratie

Het is belangrijk om de administratie bij te houden, hierdoor kan de veehouder zijn resultaat nagaan en vergelijken met andere bedrijven en de kweek-management guide van betreffende instanties.

Verder kunnen de gegevens gebruikt worden voor:

- De controle van het kweekproces.
- Het verbeteren en aanpassen van de bedrijfsvoering.
- Het herkennen van problemen.
- Het berekenen van de kostprijs.
- De financiële analyse (winst/ verlies).
- Het opstellen van een bedrijfsplan (belangrijk voor een lening bij de bank).

Een goede bedrijfsadministratie zal moeten bestaan uit zowel de registratie van technische als financiële gegevens.

**VITALO...Veevoer vrij van antibiotica en diermeel...
SUPER GEZOND!**