

TIPS:

- Volg de voeradviezen van VITALO N.V.
- Lees vóór gebruik het etiket altijd nauwkeurig.
- Het voer moet altijd DROOG en KOEL worden opgeslagen, buiten invloed van direct zonlicht en schadelijke stoffen.
- Houdt uw voeropslag- en transportruimte schoon en vrij van gevaarlijke stoffen en ongedierten z. a.: ratten, insecten etc.
- Houd zoveel mogelijk een voer- en groeiadministratie op na.
- Plaats voldoende voerbakken (1 per 40-50 kippen) en drinkbakken (1 per 100 kippen).
- Zorg ervoor dat het voer in de voerbakken goed afzakt. Let hierbij op de afstelling van de bakken en evt. regelmatig doorsteken of schudden van de bakken. Bij fijn voer de bak voor maximaal 2/3 deel vullen.
- Om verspilling te minimaliseren moet de hoogte van de benedenrand van de voerbak gelijk zijn aan de rughoogte van de kip
- Voer de leghennen beperkt (in tegenstelling tot adlibitum bij slachtkippen), bijv. De helft s'morgens vroeg en de rest s'middags laat. Voer bij voorkeur niet tijdens de warme uren van de dag. De onrust tijdens het voeren verhoogt de warmteproductie van de kippen en een volle krop kan leiden tot verstikking.
- Verstikking kan worden voorkomen door ze te stimuleren om tijdens de koele uren van de dag extra te laten eten en tijdens de hete uren van de dag geen voer te geven.
- Bij snot en ter voorkoming van verstikking tijdens warme uren van de dag de voerbakken omhoog halen.
- Pluimvee moet altijd voldoende, schoon en koel drinkwater hebben. Hygiëne van drink en voederbakken is belangrijk voor de gezondheid van de kippen en om Salmonella te voorkomen
- Zorg voor rust in en rondom de hokken.
- Houdt de kweekomgeving schoon, droog, goed geventileerd en vrij van onkruid, ongedierte en ander gevogelte (goede hygiëne).
- Optimale productie wordt gehaald als de daglengte wordt verlengd tot 16 uren licht per dag m.b.v. TL buizen. Schakel bij voorkeur de extra verlichting aan tussen 03.00 - 07.00u.
- Het plaatsen van een timer is aan te bevelen.
- Bezettingsdichtheid. Legkippen: 8 dieren per m2.
- Het is het best meerdere keren per dag eieren te rapen. Zo worden ze minder bevuild en de kans op breuk is kleiner.
- Bij het constateren van ziektesymptomen moet u spoedig in contact treden met de dierenarts om zodoende een duidelijke diagnose vast te stellen en onnodige verliezen te voorkomen.
- Op de afdeling Voorlichting kunt u vragen naar informatie over de voeropname, het gewichtsverloop en het lichtprogramma voor legkippen.

HET VOEREN VAN HET LEGKIPPEN



Vitalo

Superfeed since 1950

MORE THAN 75 YEARS OF FEED EXCELLENCE

De onmisbare schakel in de Surinaamse veeteelt sector

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting.

Surinaams Veevoerbedrijf Vitalo N.V.
FABRIKANT VAN VITALO SUPERFEED

J.A.Pengelstraat 220
Paramaribo- Suriname
E-Mail: info@vitalosuperfeed.com

HET VOEREN VAN HET LEGKIPPEN

VITALO N.V.

Het Surinaams Veevoerbedrijf VITALO bestaat sinds 23 juni 1950. Dit bedrijf is Feed Chain Alliance (FCA) gecertificeerd. Vitalo produceert kwalitatief hoogwaardige veevoer soorten voor de veeteeltsector volgens de EU normen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de klant. Vitalo slaagt erin om de FCA OVOCOM standaard met de meest stringente voorwaarden te implementeren.

Het leven van legkippen kent drie perioden:

1. 0 tot 6 weken: snelle groei

De voedselopname is nog gering, maar een goede kwaliteit is een strikte vereiste.

2. 6 weken tot de leg (=verwachbaar vanaf week16): trage groei. In deze periode vindt de ontwikkeling van de reproductie organen plaats.

3. 16-20 weken tot einde leg: legperiode

Het voer moet nu aangepast zijn om een optimale eiproductie te halen. Het verschil tussen opfok- en legvoer ligt o.a. in het ruw eiwit-, energiegehalte en ook in de kalkinhoud van het voer. Legkippen hebben vanzelfsprekend meer kalk nodig voor de vorming van de eierschalen. Fouten die gemaakt worden in voeding of huisvesting resulteren in het rapen van minder eieren tijdens de legperiode.

Kenmerken van een goede legster

Een goede leghen is te herkennen aan de fel rode kleur van de kam en door de legbeentjes te voelen. Een fel rode kam is een teken dat de kip in goede conditie is om te leggen. Onder de staart bevinden zich de legbeentjes waar de eileider en de aars uitmonden. De opening tussen de beentjes mag niet te smal zijn. Bij een goede legster kan je daar gemakkelijk twee vingers tussen leggen. En voelt de cloaca (aars) elastisch aan? Dan heb je een goede legster. Dit kun je ook herkennen aan het gebied rondom de cloaca dat onbevederd (= kaal) is.

De productieve periode

Onder ideale omstandigheden legt een kip haar eerste ei wanneer ze ongeveer 16-20 weken oud is. De eerste eieren zijn vaak heel klein. Al vlug wordt dat 60 à 65 gram. Dit geldt voor de doorsnee rassen. Aan het begin van de leg zijn de kippen ongeveer 1.6 kg. Ze mogen tot ongeveer 2kg zwaar zijn om legproblemen vanwege vervetting te voorkomen. Dit wordt bereikt door legkippen beperkt te voeren (100- 120gr/dag/kip).

Kippen die hun eerste legjaar bijna achter de rug hebben, beginnen dunschalige eieren te leggen. Meestal beginnen de kwekers op dit moment de kippen te vervangen. In zeer hete perioden kan de leg afnemen.

Het voer

VITALO N. V. produceert de volgende voersoorten voor legkippen nl.:

1. Broiler Ration Feed (BRF) met het coccidiostaticum Maxiban® (Naracin en Nicarbazine) is een 1-FASEVOER, dit voersoort is bestemd voor slacht- en legkippen vanaf dag 0 tot en met week 6. Dit volledig voer bevat additieven met een antimicrobiële werking (pre- en probiotica) en is evenwichtig van samenstelling. Het is een energierijk voer met eiwitten die zorgen voor een prima vleesaanzet.

2. Chick Growervoer is speciaal groeivoer bestemd voor leghennen in de opfokperiode (= periode vóór de leg). Het zorgt voor een goede ontwikkeling van de reproductie organen, een goed leggewicht van de leghennen (± 1.6 kg) en een optimale startconditie. Dit voer is ook met het coccidiostaticum Salinomycine te verkrijgen. Voer met Salinomycine mag van 7e week tot 12e week gevoerd worden aan leghennen.

Bij gebruik van voer met Salinomycine GEEN Tylomycine toedienen en dit voer NIET aan leghennen (in de legperiode) voeren.

3. Layer Feed (LF) is speciaal voer ten behoeve van leghennen in de legfase. Het zorgt voor een snelle stijging van de legproductie tot het maximale legpunt en ook het langer aanhouden van de legpiek. Het bevat de nodige voedingsstoffen, extra enzymen en additieven om de eischaal, eikwaliteit en eigrootheid te verbeteren en te behouden. Dit nauwkeurig uitgebalanceerde voer zorgt er verder voor dat de leghennen in goede conditie blijven en het legpercentage op peil blijft!

**VITALO...Veevoer vrij van antibiotica en diermeel...
SUPER GEZOND!**