

## TIPS:

- Het voer moet altijd DROOG en KOEL worden opgeslagen, buiten de invloed van direct zonlicht en schadelijke stoffen.
- Houdt uw voeropslag- en transportruimte schoon en vrij van gevaarlijke stoffen en ongedierten z.a.: ratten, insecten etc.
- Houd zoveel mogelijk een voer- en groeiadministratie op na.
- Volg het vaccinatieschema dat afkomstig is van uw broederij en/of dierenarts.
- Houdt de kweekomgeving schoon, droog (hygiëne) en goed geventileerd.
- Houd de kweek omgeving vrij van onkruid, gevogelte of ander ongedierte
- Zorg voor rust rondom de hokken.
- Volg de voeradviezen van VITALO.
- Lees het etiket altijd nauwkeurig.
- De kippen moeten altijd voldoende, schoon en koel drinkwater hebben.
- Een hokbezetting van 8– 10 kippen/m<sup>2</sup> is toegestaan, maar in de warme periode wordt 6 kippen/m<sup>2</sup> aanbevolen.
- Plaats voer—en drinkbakken op de rug hoogte van de kippen.
- Voordat de voerbak wordt bijgevuld het restantvoer uitschenken en apart zetten.
- Nadat de voerbak met vers voer is bijgevuld het restantvoer er boven toevoegen.
- Plaats voldoende voerbakken (1 per 40-50 kippen) en drinkbakken (1 per 100 kippen).
- Voer bij voorkeur niet tijdens de warme uren van de dag. De onrust tijdens het voeren verhoogt de warmteproductie van de kippen en een volle krop kan leiden tot verstikking.
- Verstikking kan worden voorkomen door ze te stimuleren om tijdens de koele uren van de dag extra te laten eten (door verlichting te plaatsen) en tijdens de hete uren van de dag geen voer te geven (door bijv. de voerbakken omhoog te halen).
- Plaats hitte folie onder het dak/ de zinkplaat
- Plaats ventilatoren in het hok voor verkoeling tijdens de warme uren van de dag.
- Pas het all- in all- out systeem toe bij de kweek.
- Dit systeem ligt aan de basis van een goede bedrijfs- en hokhygiëne, hetgeen betekent dat alle dieren samen worden aan- en afgevoerd.
- Bij het constateren van ziektesymptomen moet u spoedig in contact treden met de dierenarts/animal health assistant om zodoende een duidelijke diagnose en behandeling vast te stellen en onnodige verliezen te voorkomen.

# HET VOEREN VAN SLACHTKIPPEN



Vitalo

Superfeed since 1950

## MORE THAN 75 YEARS OF FEED EXCELLENCE

*De onmisbare schakel in de Surinaamse veeteelt sector*

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting.

Surinaams Veevoerbedrijf Vitalo N.V.  
**FABRIKANT VAN VITALO SUPERFEED**

J.A.Pengelstraat 220  
Paramaribo- Suriname  
E-Mail: [info@vitalosuperfeed.com](mailto:info@vitalosuperfeed.com)

# HET VOEREN VAN SLACHTKIPPEN

## VITALO N.V.

Het Surinaams Veevoerbedrijf VITALO bestaat sinds 23 juni 1950. Dit bedrijf is Feed Chain Alliance (FCA) gecertificeerd. Vitalo produceert kwalitatief hoogwaardige veevoer soorten voor de veeteeltsector volgens de EU normen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de klant. Vitalo slaagt erin om de FCA OVOCOM standaard met de meest stringente voorwaarden te implementeren.

## Het kweekprogramma

De groei bij slachtkippen wordt voor een groot deel bepaald door het opnemen van voer dat voldoet aan de voedingsbehoefte van de kip, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de volgende factoren o.a.:

- de omgevingscondities (hygiëne, temperatuur, ligging van het hok en de luchtvochtigheid in het hok)
- het dier (ras, gewicht, leeftijd, opnamecapaciteit, lichaamsconditie en productiestadium van het dier)
- de voeding (vorm, structuur, smakelijkheid en energieniveau)
- preventieve gezondheidszorg en vaccinaties

## Het voer

De voeding van slachtkippen dient tot de in stand houding van het lichaam en voor de productie van vlees. Om de kip gezond te houden, moet in haar voedingsbehoefte worden voorzien.

Over het algemeen neemt de eiwitbehoefte van de kip af naarmate zij ouder wordt, terwijl het lichaamsgewicht en de daaraan gekoppelde energiebehoefte toenemen.

De probiotisch werkende stoffen in het voer belemmeren de ontwikkeling van ziekmakende micro- organismen in de darmen en stimuleren de werking van de darmflora.

Vitalo produceert de volgende voersoorten voor slachtkippen:

### 1. Broiler Ration Feed (BRF)

met het coccidiostaticum Maxiban® (Naracin en Nicarbazine) is een 1- FASEVOER. Deze voersoort is bestemd voor slachtkippen vanaf dag 1 tot de slacht. Dit volledig voer bevat additieven met een antimicrobiële werking (pre- en probiotica) en is evenwichtig van samenstelling. Het is een energierijk voer met eiwitten die zorgen voor een prima vleesaanzet., bijvoeren is niet nodig!

### 2. Broiler Finisher Feed (BFF)

houdt het gewicht van de kippen in stand en de voerkosten laag. Het is speciaal voer dat tijdens de slachtperiode wordt gevoerd aan de kippen (ouder dan 6 weken).

Ons voer is vrij van antibiotica, dier meel en schadelijk stoffen dus geen gezondheidsrisico's voor mens en dier.

De kuikens krijgen vanaf de eerste levensdag de juiste voedingsstoffen in de juiste verhouding met VITALO SUPERFEED van VITALO.

Opmerkingen:

- Bij het gebruik van voer met coccidiostaticum ALTIJD het etiket goed lezen!
- Controleer bij medicatie ALTIJD of dit in combinatie met het coccidiostaticum mag worden toegediend en op welk moment van de kweekfase dit mag!

In de tabel hieronder wordt het gemiddelde voerverbruik per kip per week weergegeven.

Vergelijk voerverbruik per kip/week (gram)	
Leeftijd (dgn)	Gemidd. vitalo proeven en literatuur waarde Cobb 500
7	141
14	324
21	617
28	888
35	1191
42	1373
<b>Totaal</b>	<b>4534</b>

bron: *Vleeskuiken Resultaten & Voedings Supplementen voor Cobb 500 en Resultaten van uitgevoerde proeven door Vitalo.*

**VITALO...**Veevoer vrij van antibiotica en diermeel...  
**SUPER GEZOND!**